

莱佛士叶猴工作小组

展现

柔佛州的 灵长类动物





简介

了解马来西亚半岛柔佛州的六种非人灵长类动物！

柔佛州有着丰富的值得珍惜和保护的生物自然遗产。在本手册中，我们分享了柔佛州灵长类动物的信息、它们所面临的保护挑战以及我们如何能尽一份自己的责任和义务。地图中指出的四个保护区是我们能够在野外观赏这些灵长类动物的地方。



昼行性



莱佛士叶猴

(*Presbytis femoralis femoralis*)

国际自然保护联盟保护级别：**濒危**

莱佛士叶猴在全球只分布在马来西亚的柔佛州和彭亨州，以及新加坡。它的全身基本呈黑色，但沿着胸部、内臂和大腿下侧有白色带。因为生性害羞，它很少下至地面活动。常被误认为眼镜叶猴，不过莱佛士叶猴婴猴全身多是白色，而眼镜叶猴的婴猴是橙色。



昼行性



眼镜叶猴

(*Trachypithecus
obscurus obscurus*)

国际自然保护联盟保护级别: 无危

又被称为郁乌叶猴，眼镜叶猴在眼睛和嘴巴周围有独特的白环。婴猴出生时全身呈橙色。这个亚种只有在马来半岛（从南部的柔佛州到北部的玻璃市）才能找到。它主要以叶片、果实和花等为食，有时也会吃昆虫。与较羞怯的莱佛士叶猴相比，眼镜叶猴更容易看到。



昼行性



长尾猕猴

(*Macaca fascicularis fascicularis*)

国际自然保护联盟保护级别: 无危

长尾猕猴是亚洲最普遍的猴类之一，在森林边缘、红树林、沿海栖息地以及一些城市地区都能看见。就因如此，我们在大自然中所看到的第一种猴类很有可能便是适应能力非常强的长尾猕猴。它主要以果实、叶片、昆虫和螃蟹等小动物为食（因此它也被称为食蟹猕猴）。



昼行性



南豚尾猴

(*Macaca nemestrina*)

国际自然保护联盟保护级别：**易危**

南豚尾猴具有特征性的短尾，仿佛猪的尾巴。它的头顶上还有一簇黑色的头发，使它的脸看上去像心形模样。南豚尾猴如同长尾猕猴一样，具有非常强的适应能力。南豚尾猴经常在地面上吃果实和小动物，如种植园里的老鼠。



夜行性



间蜂猴

(*Nycticebus coucang*)

国际自然保护联盟保护级别：**易危**

又被称为中懒猴，间蜂猴可在马来半岛、新加坡、印度尼西亚（苏门答腊岛）和泰国找到。它一般以昆虫、软体动物、鸟蛋、果实和叶片等为食。该物种通常在夜晚活动，所以昼间难得一见。尽管平时动作缓慢，但在紧急时刻，它仍然可以快速行动。间蜂猴是地球唯一有毒的灵长类。它可分泌毒素，混合唾液，必要时保护自己。



昼行性



马来西亚 白掌长臂猿

(*Hylobates lar lar*)

国际自然保护联盟保护级别：**濒危**

白掌长臂猿没有尾巴。这个亚种只有在马来半岛才能找到。它主要以果实、嫩枝、叶片和昆虫为食。非常难以亲见长臂猿，但它的鸣唱（通常在早晨）非常响亮和谐。长臂猿用它们长长的双臂摆荡，在林间自由穿梭。

威胁

栖息地丧失

棕油种植园、高速公路和道路造成了森林消失，使得野生动物无家可归、无食可吃，导致动物数量下降甚至地区性灭绝。

猎杀和野生动物贸易

从野外捕获的灵长类动物经常被当作宠物加以贩卖，也有可能被当作旅客的摄影道具。这些人类行为非常残忍，同时野生动物遭受囚禁。它们的身体有时被作为传统药材食材出售，但实际上并无治愈疾病或促进健康的功效。

人类与野生动物冲突

野生动物失去家园后，不得被迫接近人类和来到城市环境。喂养这些野生动物对它们有害，并会使它们进一步接近人类。

观赏它们时，该做什么？

请不要喂食

喂食它们会改变它们自然的生态行为，并使它们养成依赖人类食物的习性。避免携带塑料袋，也不要再在猴子面前进食。

请勿招惹它们

戏弄与触摸野生动物反而会激发它们的侵略性。时刻与它们保持4-5米（一车长）的距离。

行动起来！

请不要把野生灵长类动物当宠物。这一行为对它们非常残酷，对您来说也很危险。如有发现贩卖野生动物的行径，请立即通知马来西亚半岛野生生物及国家公园保护局(Perhilitan): 1800-885-151 (热线) 或 +60 19-356 4194 (Whatsapp)。

*国际自然保护联盟濒危物种红色名录以2015年评估为准

出品

莱佛士叶猴工作小组



Jane Goodall Institute (Singapore)

资金赞助由



Wildlife Reserves Singapore
Conservation Fund



合作伙伴



照片版权属

Andie Ang | Sabrina Jabbar | Vilma D'Rozario

翻译者

Andie Ang | Niu Kefeng

手册设计

Jacqueline Wong